

Tema 3

Autoevaluación

1. Marque con una X lo que considere correcto en relación a la dermatitis de contacto.

- a) Es siempre de causa profesional.
- b) Son siempre producidas por mecanismos alérgicos.
- c) En su génesis pueden estar imbricados agentes etiológicos tanto irritativos como alérgicos.
- d) Es más frecuente en niños.
- e) No se acompaña de síntomas.

2. La presencia de costras y el inicio de la descamación, observándose además eritema, ligero edema y humedad más perceptible al tacto que visible, caracterizan según el grado de intensidad del cuadro de dermatitis de contacto (DC) a:

- a) DC crónica
- b) DC aguda
- c) DC subaguda
- d) DC sobreaguda.

3. En relación al Dermatitis atópica marque la agrupación correcta.

- a) La edad del paciente no es un factor importante a la hora de decidir el tratamiento a emplear.
- b) Los antecedentes personales o familiares de atopía se consideran un criterio mayor para el diagnóstico de la enfermedad.
- c) Las lesiones en el lactante se caracterizan por su estado crónico y la localización en flexuras.
- d) En adultos predominan las placas engrosadas y liquenificadas localizadas en la nuca y región dorsal de los pies.
- e) La presencia de prurito y xerosis cutánea nos ayuda a descartar la enfermedad.
- f) La pitiriasis alba y la queratosis pilar son manifestaciones asociadas a la dermatitis atópica.
- g) La tendencia a las infecciones cutáneas no constituye un criterio menor de la enfermedad.

1. ___ a, b, c, f

2. ___ a, c, f, g

3. ___ b, d, e, f

4. ___ a, b, d, f

5. ___ a, b, d, g

6. ___ b, c, e, g

4. El empleo de medicamentos, tanto por vía tópica como sistémica, puede provocar diversos tipos de reacciones adversas en la piel. Mencione estas y argumente.

5. Responda verdadero (V) o falso (F) los siguientes planteamientos en relación a la Urticaria

a) ___ Las lesiones que caracterizan a la urticaria son los nódulos y máculas.

b) ___ La urticaria se considera aguda cuando tiene menos de 6 semanas de evolución.

c) ___ La urticaria se presenta sin síntomas acompañantes.

d) ___ Las lesiones individuales tienden a desaparecer en menos de 24 horas sin dejar ninguna señal residual.

e) ___ En las formas crónicas de urticaria la causa puede ser una infección focal crónica.

f) ___ La epinefrina es un medicamento indicado en los cuadros de angiodema-urticaria aguda.

g) ___ La urticaria puede ser producida por agentes físicos como el frío.

6. En relación al lupus eritematoso discoide crónico marque los planteamientos correctos.

a) ___ La topografía de las lesiones es la piel no expuesta al sol.

b) ___ Las lesiones se encuentran formadas por una tríada: eritema, escama y atrofia.

c) ___ Las lesiones al afectar el cuero cabelludo pueden provocar una alopecia cicatricial

d) ___ Dentro de las medidas generales se orientan evitar la exposición al sol, así como el uso de protector solar.

e) ___ La cloroquina y la prednisona son medicamentos usados en el lupus eritematoso discoide crónico.

7. En relación al Pénfigo vulgar escoja la asociación correcta.

- a) Se caracteriza por la aparición de ampollas tensas que posteriormente se hacen flácidas las que aparecen en piel y/o mucosas aparentemente normales.
- b) Las ampollas, al romperse dejan pequeñas zonas denudadas que curan con facilidad de forma espontánea.
- c) El signo de Nikolsky es positivo
- d) Al presionar la ampolla, el líquido se distiende bajo la piel.
- e) La prednisona se encuentra contraindicada en el tratamiento de estos pacientes.
- f) El tratamiento tópico de las lesiones consiste en la aplicación de permetrina en loción.
- g) Debe evitarse ingerir abundantes líquidos.

1. __ a,b,d

2. __ a,c,d

3. __ b,c,f

4. __ a, e, g

5. __ e, f, g

6. __ b, c, d