

## Tema 4.

### Autoevaluación

**1. En relación a los nevos melanocíticos señale cuáles de las siguientes alternativas son correctas.**

- a) \_\_\_ La presencia de gran cantidad de nevos se asocia a un mayor riesgo de melanoma.
- b) \_\_\_ Son lesiones de forma redondeada u ovoide asimétricas y mal delimitadas.
- c) \_\_\_ La gran mayoría de estas lesiones tienen un comportamiento completamente benigno.
- d) \_\_\_ La mayoría de estas lesiones no precisan tratamiento dada su benignidad.
- e) \_\_\_ Aquellos sometidos a traumas repetidos constituye una indicación para su excéresis.
- f) \_\_\_ El crecimiento de forma rápida y los cambios de coloración son elementos normales en su evolución.
- g) \_\_\_ El tratamiento de estos nevos consiste en la electrifulguración.

**2. En relación a los factores de riesgo para el melanoma marque con una X los que considere correctos.**

- a) \_\_\_ Antecedentes familiares de esta enfermedad.
- b) \_\_\_ Fototipos cutáneos V y VI.
- c) \_\_\_ Presencia de un elevado número de nevos pigmentarios
- d) \_\_\_ Uso de protector solar
- e) \_\_\_ Episodios agudos de quemaduras intensas por luz solar.

**3. Seleccione verdadero (V) o falso (F) en relación a los siguientes enunciados sobre el melanoma maligno.**

- a) \_\_\_ El melanoma de extensión superficial aparece principalmente en pacientes ancianos con daño actínico crónico.
- b) \_\_\_ La forma clínica más frecuente de melanoma es el lentiginoso acral
- c) \_\_\_ La Cirugía es el tratamiento de elección en el melanoma primario.

- d) \_\_\_\_ Los pacientes que han sufrido melanoma, tienen un riesgo elevado para presentar un segundo melanoma
- e) \_\_\_\_ La dermatoscopia es de poca utilidad para el diagnóstico de melanoma cuando evaluamos una lesión pigmentada.

**4. Relacione la forma clínica de melanoma (columna A) con los elementos clínicos (columna B)**

A	B
a) Melanoma nodular	__ Se observa en la cara de personas de edad avanzada en forma de una mancha pigmentada con diferentes tonos de café o negro y zonas de aspecto tumoral.
b) Melanoma de extensión superficial	__ Inicia en forma de una lesión plana en la cual se observan distintos tonos de pigmentación, considerada la forma clínica más frecuente.
c) Melanoma lentiginoso acral	__ considerada la forma más agresiva, con crecimiento vertical desde el inicio y gran tendencia a producir metástasis.
d) Melanoma lentigo maligno	__ Se localiza en la región palmar o plantar o en las áreas subungueal o paraungueal de manos y pies, forma más frecuente en pacientes negros. __ Lesión de aspecto papular, color marrón claro uniforme y bordes regulares bien delimitados.

**5. El Carcinoma basocelular es un tipo frecuente de cáncer de piel. En relación a sus características seleccione la agrupación correcta.**

- a) Menos frecuente en población negra que en blanca.
- b) Hasta las 2/3 partes de los Carcinomas basocelulares aparecen en zonas faciales no expuestas al sol.
- c) Más frecuente en mujeres.
- d) Aparece con mayor frecuencia a nivel de las mucosas.
- e) Los pacientes con Xeroderma pigmentoso tienen una mayor predisposición al desarrollo del Carcinoma basocelular.

1. \_\_\_ a, c 2. \_\_\_ b, c 3. \_\_\_ b, d 4. \_\_\_ c, e 5. \_\_\_ a, e 6. \_\_\_ d, e

**6. Señale el principal diagnóstico diferencial del Carcinoma basocelular pigmentado.**

- a) \_\_\_ Queratosis seborreica
- b) \_\_\_ Melanoma maligno
- c) \_\_\_ Nevus displásico
- d) \_\_\_ Nevus azul
- e) \_\_\_ Ninguno de los anteriores.

**7. Paciente masculino, blanco de 67 años de edad que acude a consulta por la presencia de una lesión localizada en la región lateral izquierda de la nariz próxima a la región infraorbitaria de aproximadamente 2 años de evolución, realizándose el diagnóstico de carcinoma basocelular.**



- a) Mencione las características clínicas en las que se basó para realizar dicho diagnóstico.
- b) Diga la variedad clínica que presenta.
- c) Conducta terapéutica

d) Mencione las medidas encaminadas a la prevención del surgimiento de esta neoplasia.

8. Seleccione Verdadero (V) o Falso (F) los siguientes planteamientos en relación al Carcinoma epidermoide.

- a) \_\_\_ El carcinoma epidermoide es un tumor que se deriva de la capa espinosa de la epidermis, considerado de crecimiento rápido y agresivo.
- b) \_\_\_ El cuerno cutáneo es un tipo de queratosis actínica hipertrófica en la que la biopsia cutánea está indicada cuando se base se encuentra infiltrada.
- c) \_\_\_ El Carcinoma epidermoide predomina en regiones de la piel que no se exponen al sol.
- d) \_\_\_ La enfermedad de Bowen es considerada un carcinoma epidermoide in situ de crecimiento rápido que afecta al sexo masculino.
- e) \_\_\_ En la etiopatogenia del carcinoma epidermoide se consideran la presencia de dermatosis crónicas como el liquen plano erosivo y la infección por el virus del papiloma humano.

9. Paciente masculino, 58 años de edad, fototipo III, que acude a consulta porque hace varias semanas comenzó a presentar a nivel del hombro una “verruga”, la cual comenzó a crecer de forma rápida. Al examen observamos lesión de aspecto tumoral, eritematosa, bordes bien definidos y ligeramente infiltrados, indurada y ulcerada en su superficie.



- A) Mencione la Impresión diagnóstica.
- B) Mencione 3 diagnósticos diferenciales.
- C) Conducta terapéutica.

**10. Relacione ambas columnas según corresponda en relación al carcinoma epidermoide**

A	B
1. Papulosis bowenoide	___ dermatosis precancerosa que es considerada carcinoma “in situ” cuando la atipia compromete a todo el espesor de la epidermis. Lesión descamativa, adherente, con superficie áspera en áreas de piel expuesta al sol.
2. Queratosis actínica	___ Se presenta en forma de una o varias placas verrugosas localizadas en glande, dorso del pene, labios mayores y menores, estas lesiones están inducidas por el HPV 16 y tienen potencialidad maligna.
3. Enfermedad de Bowen	___ Se denominan de esta forma a los CEC intraepidérmicos que se localizan en la zona genital masculina. Se manifiesta como una placa eritematosa intensa, brillante, bien delimitada que puede ulcerarse y presentar costras en su superficie.
4. Carcinoma epidermoide ulceroso	___ Puede afectar cualquier parte de la piel, pero es más frecuente en las áreas expuestas al sol. Se presenta en forma de placa de bordes definidos, escamosa, color piel o eritematosa de crecimiento lento y progresivo, usualmente asintomática, en pliegues puede confundirse con enfermedades micóticas.
5. Eritroplasia de Queyrat	___ Lesión invasiva que primero puede simular una verruga vulgar o una queratosis; al crecer, presenta una base infiltrada y su superficie muestra grados diversos de queratosis
	___ Lesión invasiva, saliente de superficie irregular, al punto de conformar una masa vegetante que puede ser grande
	___ En su forma típica se observa una úlcera de superficie irregular que asienta sobre una base saliente, indurada, las metástasis suelen ser frecuentes.

**11. Paciente femenina, blanca de 42 años de edad con antecedentes de salud. Refiere que desde niña presenta un lunar en la pierna izquierda y desde hace aproximadamente 7 meses comenzó a crecer. Al examen físico se observa lesión asimétrica en ambos ejes, presencia de color pardo oscuro y claro, de**

**aproximadamente 2x1cm de diámetro, elevada en su porción superior. Con estos datos realiza el diagnóstico presuntivo de melanoma maligno**

- a) Mencione la forma clínica a la que corresponde**
- b) Además de la inspección en que técnica te apoyarías para establecer el diagnóstico.**
- c) Mencione 3 diagnósticos diferenciales.**

