

ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO AÑO 2023

Vacuna	Inmuniza contra	Clasificación según			Fecha de las dosis				Dosis	Vía	Región anatómica de inyección	Lugar de inyección
		Componente biológico	Composición	Preservante	1ra	2da	3ra	React				
HB	Inmuniza contra la Hepatitis B	Microorg muertos o inactivados	Monovalente	Hidróxido de aluminio Timerosal	Al nacer				0,5 ml	IM	CALM	Maternidad
BCG	Tuberculosis	Microorg vivos o atenuados	Monovalente	No tiene preservante	Al nacer				0,05 ml	ID	Deltoides izquierdo	Maternidad
Heberpenta o Pentavalente	Difteria Tétanos Tos ferina Hepatitis B Haemophilus Influenzae tipo B	Microorg muertos o inactivados	Combinada	Hidróxido de aluminio Timerosal Cloruro de Sodio	2 meses	4 meses	6 meses	18 meses	0,5 ml	IM	CALM A los 18 meses en el deltoides	Vacunatorio
AMBC (Antimeningococcica)	Enfermedad Meningococcica B y C	Microorg muertos o inactivados	Monovalente	Hidróxido de aluminio	3 meses	5 meses			0,5 ml	IM	CALM	Vacunatorio
IPV	poliomielitis	Microorg muertos o inactivados	Monovalente		4 meses	8 meses			0,1 ml	ID	Deltoides derecho	Vacunatorio
PRS	Papera Rubeola Sarampión	Microorg vivos o atenuados	Combinada	Antígeno del huevo Rojo Congo	12 meses			6 años 1er grado	0,5 ml	SC	Deltoides	Vacunatorio
D. T. (Dúplex)	Difteria y el Tétano	Microorg muertos o inactivados	Polivalente	Hidróxido de aluminio				6 años 1er grado	0,5 ml	IM	Deltoides	Vacunatorio
AT Antitífica	Fiebre tifoidea	Microorg muertos o inactivados	Monovalente	Fenol Cloruro de Sodio	10 años 5to grado			13 años (8vo grado) 16 años (11no grado)	0,5 ml	IM	Deltoides	Vacunatorio

Vacuna	Inmuniza contra	Clasificación según			Fecha de las dosis				Dosis	Vía	Región anatómica de inyección	Lugar de inyección
		Componente biológico	Composición	Preservante	1ra	2da	3ra	React				
TT (toxóide tetánico)	Tétano	Microorg muertos o inactivados	Monovalente	Hidróxido de aluminio				14 años (9no grado)	0,5 ml	IM	Deltoides	Vacunatorio
				Timerosal				Grupo de 15 a 59 años Cada 10 años				
				Fenol residual				Grupo de 60 años y más Cada 5 años				
OPV	poliomielitis	Microorg vivos o atenuados	Monovalente	Cloruro de Magnesio Neomicina	Por campaña Niños desde 1 mes de nacido hasta 2 años, 11 meses y 29 días reciben 2 dosis. Niños de 9 años a 9 años, 11 meses y 29 días reciben una reactivación				gotas	oral		Vacunatorio

Si evento adverso en la 1ra dosis de la Penta administrar:

DT+Hib+HB a los 4 y 6 meses

3ra dosis: Hib+HB y no dúplex porque se administra en el reactivo

ESQUEMA DE VACUNACIÓN A GESTANTES CON TOXOIDE TETÁNICO

Criterios	Se administra a las 22 semanas	Se administra a las 26 semanas	Se administra el reactivo
Cuando no hay evidencia de la vacunación	x	x	Al año de la 1ra dosis
Si existe evidencia de la vacunación en los últimos 10 años			
Si le corresponde la reactivación en el año en que está embarazada		x	

ESQUEMA DE VACUNACIÓN A HIJOS DE MADRES CON ANTÍGENO POSITIVO

Vacuna	Fecha de las dosis				Dosis	Vía	Región anatómica de inyección	Lugar de inyección
	1ra	2da	3ra	React				
HB	Al nacer	1 mes	2 meses	12 meses	0,5 ml	IM	CALM 12 m deltoides	Maternidad Vacunatorio
Gamma	Al nacer				1 ml	IM	CALM derecho	Maternidad
BCG	3 meses				0,05 ml	ID	Deltoides izquierdo	Maternidad
AMBC	3 meses	5 meses			0,5 ml	IM	CALM	Vacunatorio
PRS				12 meses	0,5 ml	SC	Deltoides	Vacunatorio
QHib	2 meses	4 meses	6 meses	18 meses	0,5 ml	IM	CALM Deltoide-18 meses	Vacunatorio
DPT	2 meses	4 meses	6 meses	18 meses	0,5 ml	IM	CALM Deltoide-18 meses	Vacunatorio

ESQUEMA DE VACUNACIÓN A GRUPOS DE RIESGOS

Vacuna	Dosis	Vía	Región anatómica de inyección	Fecha de las dosis				Lugar de inyección
				1ra	2da	3ra	react	
Antitífica (AT)	0.5 ml	IM	Deltoide	x				Vacunatorio
HB	0.5 ml	IM	Deltoide	x	Al mes	A los 5 meses		Vacunatorio
Antileptosirica	0.5 ml	IM	Deltoide	x	entre 6 y 12 semanas			Vacunatorio

ESQUEMA DE VACUNACIÓN A COLABORADORES

Vacuna	Dosis	Vía	Región anatómica de inyección	Fecha de las dosis				Lugar de inyección
				1ra	2da	3ra	react	
Antiinfecciosa	0.5 ml	IM	Deltoide	x				Vacunatorio
Antitífica (AT)	0.5 ml	IM	Deltoide	x				Vacunatorio
PRS	0.5 ml	SC	Deltoide	x				Vacunatorio
HB	0.5 ml	IM	Deltoide	x	Al mes	A los 5 meses		Vacunatorio
AMBC	0.5 ml	IM	Deltoide	x	entre 6 y 8 semanas			Vacunatorio
Antileptosirica	0.5 ml	IM	Deltoide	x	entre 6 y 12 semanas			Vacunatorio