

RESUMEN DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN

| VACUNAS | Protegen contra | 1ra dosis | 2da dosis | 3ra dosis | Reactivo |
|---|---|--|------------|------------------------|---|
| BCG | Tuberculosis | Dosis única al nacer | | | |
| HB | Hepatitis B | Al nacer | | | |
| Pentavalente | Difteria, Tétanos, Tos ferina, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipo B | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 18 meses |
| AMBC (Antimeningococcica) | Enfermedad Meningococcica B y C | 3 meses | 5 meses | | |
| IPV | Poliomielitis | 4 meses | 8 meses | | |
| PRS | Papera, Rubeola, Sarampión | 12 meses | | | 6 años 1er grado |
| DT (Duplex) | Difteria, Tétanos | | | | 6 años 1er grado |
| AT (Antitífica) | Fiebre Tifoidea | 10 años 5to grado | | | 13 años 8vo grado 16 años 11no grado |
| TT (Toxoide Tetánico) | Tétano | | | | 14 años 9no grado Cada 10 años Grupo de 15 a 59 años Cada 5 años Grupo de 60 años y más |
| OPV | Poliomielitis | Por campaña Niños desde 1 mes de nacido hasta 2 años, 11 meses y 29 días reciben 2 dosis. Niños de 9 años a 9 años, 11 meses y 29 días reciben una reactivación | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE TOXOIDE TETÁNICO A GESTANTES | | | | | |
| CRITERIOS | | 1ra dosis | 2da dosis | Reactivo | |
| Evidencia de vacunación en los últimos 10 años | | NO SE INMUNIZA | | | |
| Le corresponde el reactivo en el año en que está embarazada | | | 26 semanas | | |
| No hay evidencia de vacunación | | 22 semanas | 26 semanas | Al año de la 1ra dosis | |

| COMPONENTE BIOLÓGICO | |
|-------------------------------------|--|
| Microorganismos muertos o inactivos | HB, Pentavalente, AMBC, IPV, DT, AT, TT |
| Microorganismos vivos o atenuados | BCG, PRS, OPV |
| COMPOSICIÓN | |
| Monovalente | HB, BCG, AMBC, IPV, AT, TT, OPV |
| Combinada | Pentavalente, PRS |
| Polivalente | DT, |
| PRESERVANTES | |
| Hidróxido de Aluminio | HB, Pentavalente, AMBC, DT, TT |
| Timerosal | HB, Pentavalente, TT |
| Cloruro de Sodio | Pentavalente, AT |
| Antígeno del huevo | PRS |
| Rojo Congo | PRS |
| Fenol | AT |
| Fenol residual | TT |
| Cloruro de Magnesio | OPV |
| Neomicina | OPV |
| DOSIS | |
| 0,5 ml | HB, Pentavalente, AMBC, PRS, DT, AT, TT |
| 0,05 ml | BCG |
| 0.1 ml | IPV |
| 2 gotas | OPV |
| VÍA | |
| IM (intramuscular) | HB, Pentavalente, AMBC, DT, AT, TT |
| ID (intradérmica) | BCG, IPV |
| SC (subcutánea) | PRS |
| Oral (sublingual) | OPV |
| REGIÓN ANATÓMICA | |
| CALM (cara anterolateral del muslo) | HB, Pentavalente, AMBC |
| Deltoides izquierdo | BCG |
| Deltoides derecho | IPV |
| Deltoides | PRS, Pentavalente a los 18 meses, DT, AT, TT |