

FARMACOLOGÍA II



Conferencia 8

Dr. C. Nubia Blanco Barbeito Barbeito
Profesor e Investigador Titular

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN DE CUBA.

Vacuna / Protege	Edad de la dosis				Dosis (ml)	Vía	Región de aplicación	Lugar de aplicación
	1 ^{ra}	2 ^{da}	3 ^{ra}	Reactivación				
BCG* / Tubercolínesis	Al nacer	----	----	----	0,05	ID	Deltoides Izquierdo	Maternidad
Heberbiovac HB* / Hepatitis B	Al nacer	---	---	---	0,5	IM	1/3 medio de la cara anterior - lateral del músculo	Maternidad
Heberipenta-1 / Difteria, Toxofíntica, Tétanos, Hepatitis B y Haemophilus Influenzae Tipo B	2 m	4 m	6 m	18 m	0,5	IM	1/3 medio de la cara anterior - lateral del músculo. A los 18 M en el Deltoides	Policlínicos
VA-MENINGOC-BC / Meningococo B y C	3 m	5 m	----	----	0,5	IM	1/3 medio de la cara anterior - lateral del músculo	Policlínicos
IPV / Poliomielitis	4 m	8 m	----	----	0,1	ID	Deltoides Derecho	Policlínicos
DPT-VAC* / Difteria, Tétanos y Toxofíntica	2 m	4 m	6 m	18 m	0,5	IM	Deltoides	Policlínicos
Quimi-Hib* / Haemophilus Influenzae Tipo B.	2 m	4 m	6 m	18 m	0,5	IM	Deltoides	Policlínicos
PRS / Parotiditis, Rubéola y Sarampión	12 m	----	----	6 años	0,5	SC	Deltoides	Policlínicos y Escuelas
VA-DIF-TET / Difteria y Tétanos	----	----	----	6 años	0,5	IM	Deltoides	Escuelas
Vax-TYVI / Fiebre Tifóidea	10 años	----	----	13 y 16 años	0,5	IM	Deltoides	Escuelas
Vax-TET / Tétanos	----	----	----	14 años	0,5	IM	Deltoides	Escuelas
OPV / Poliomielitis	En campaña anual. Niños menores de tres años y 9 años.				2 gotas	Oral	----	Policlínicos y Consultorios

* Los casos de madres positivas al antígeno de superficie de la Hepatitis B, se vacunarán con BCG a los 3 meses de nacidos. Se les aplicarán 4 dosis de vacuna de la Hepatitis B (al nacer, 1 mes, 2 meses y al año) y se reactivará a los 18 meses, con DPT y Hib. El resto de las vacunas según el esquema.

