


Conferencia: Síndrome Hemipléjico



Dr. Javier V. Sánchez López

Máster en Ciencias

Especialista de II grado en Neurología y en Cuidados Intensivos

Profesor Auxiliar. Investigador Auxiliar

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía



No hay cuestiones agotadas sino
hombres agotados en las cuestiones
Cajal

Conferencia: Síndrome Hemipléjico

- *Concepto*
- *Consideraciones anatomofuncionales*
- **Clasificación**
- **Diagnóstico positivo. Sindromografía**
- **Topografía del Síndrome Hemipléjico**
- **Etiología**


Concepto:

Es un síndrome ocasionado por la lesión de los centros o vías del sistema piramidal y consiste en la pérdida parcial o completa de la motilidad de una mitad del cuerpo


Hemiparesia - Hemiplejía


Síndrome Hemipléjico


- Consideraciones Anatomofuncionales



Horizontal sections through cerebrum








Síndrome Hemipléjico. Clasificación

- **TOTAL:** Si están afectadas la cara y los dos miembros
- **DIRECTA:** Si la cara y los dos miembros afectados están del mismo lado
- **PROPORCIONAL:** Si la cara y los dos miembros están afectados en la misma medida



Síndrome Hemipléjico. Clasificación

- Hemiplejía Fláccida
- Hemiplejía Espástica
- Hemiplejía Larvada
- Hemiplejía durante el Coma

Lesión de la Motoneurona Central

- Pérdida de fuerza muscular (abarca muchos músculos)
- Hipertonía (espasticidad muscular)
- No hay atrofia muscular verdadera, solo disminución del volumen del grupo muscular afectado por desuso
- Hiperreflexia osteotendinosa
- Reflejos cutáneoabdominales disminuidos o abolidos
- Babinski y sucedáneos
- Clonus

Maniobras Exploratorias

- Maniobra de Mingazzini: Superior e Inferior
- Maniobra de Barré: Superior e Inferior
- Maniobra de Pierre - Marie - Foix

Diagnóstico Topográfico (Altura de la Lesión)

- Hemiplejía Cortical (a predominio facio - braquial)
- Hemiplejía Subcortical (corona radiada)
- Hemiplejía Capsular (T-D-P)
- Hemiplejía Talámica

Diagnóstico Topográfico (Altura de la Lesión)

- Hemiplejía Peduncular Alterna (Síndrome de Weber)
- Hemiplejía Protuberancial Alterna (Síndrome de Millard – Gubler)
- Hemiplejía Bulbar Alterna (Síndrome de Jackson)

Síndrome Hemipléjico. Etiología

- Vascular (Isquémica y Hemorrágica)
- Tumoral
- Infecciosa
- Desmielinizante
- Traumática
- Degenerativa

Tener fe es saber que existe el océano al
encontrarnos con un simple arroyo
W.W.

